

Nombre:

Universidad y Nivel:

Fecha:

D

M

A

1.Cuál es la patología más frecuente de la mama masculina?

- a. Carcinoma Ductal Infiltrante
- b. Lipoma
- c. Ginecomastia
- d. Quiste de inclusión epidérmica

2. ¿En cuál de los siguientes escenarios, la mamografía tiene mejor rendimiento?

- a. Valorar la integridad de los implantes de silicona
- b. Evaluación de líquido periprotésico
- c. Valoración de ruptura de implantes de solución salina
- d. Evaluación de masas asociadas a implantes

3. Acerca de las asimetrías no es cierto que:

- a. Son generalmente planas, sin bordes convexos y grasa intercalada
- b. El 50% son una superposición de estructuras fibroglandulares.
- c. Las lesiones verdaderas pueden aparecer en una sola proyeccion.
- d. Una masa debe ser llamada asimetría hasta que se demuestre su tridimensionalitas.

4. En cuanto a los tipos de ruptura de los implantes mamarios, cual es VERDADERA:

- a. Hay tres tipos principales de ruptura: intracapsular, extracapsular e intercapsular.
- b. En la ruptura intracapsular hay ruptura de la cápsula de poliuretano y se contiene por la cápsula fibrosa.
- c. En la ruptura extracapsular la cápsula de poliuretano se conserva y se rompe la capsula fibrosa causando la extraluminización de la silicona.
- d. La ruptura intercapsular se asocia más frecuentemente a fenómenos inflamatorios.

5. Los márgenes de las masas por mamografía según BI RADS son los siguientes, excepto:

- a. Microlobulados
- b. Angulares
- c. Oscurecidos
- d. Circunscritos

Nombre:
Universidad y Nivel:
Fecha:

6. LA LÍNEA POSTERIOR DEL PEZÓN, SE REFIERE, A UNA LÍNEA TRAZADA PARALELA AL PEZÓN A 1 CM DE DISTANCIA?

VERDADERO FALSO

7. LA MAYORÍA DE LOS CANCERES, SE VISUALIZAN EN EL CUADRANTE SUPERIOR INTERNO DEL SENO DERECHO?

VERDADERO FALSO

8. EL ASPECTO SUPERIOR Y MEDIAL DEL SENO ES MAS MÓVIL QUE EL INFERIOR Y LATERAL?

VERDADERO FALSO

9. LA PROYECCIÓN OBLICUA INCLUYE MAS TEJIDO MEDIAL Y POSTERIOR DEL SENO?

VERDADERO FALSO

10. LA PROYECCIÓN CC INCLUYE MAS TEJIDO AXILAR DEL SENO?

VERDADERO FALSO

11. CON UN POBRE POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE EN REALIZAR LAS PROYECCIONES, LA POSIBILIDAD DE NO DIAGNOSTICAR UN CÁNCER PUEDE LLEGAR AL 84%.

VERDADERO FALSO

12. UNA MAMOGRAFÍA DE DIAGNOSTICO DEBE INCLUIR 6 PROYECCIONES Y ECOGRAFÍA COMPLEMENTARIA?

VERDADERO FALSO

13. UNA MAMOGRAFÍA B3 DEBE REPETIRSE CADA SEIS (6) MESES, POR ESPACIO DE DOS (2) AÑOS?

VERDADERO FALSO

Nombre:
Universidad y Nivel:
Fecha:

14. LA GLANDULA MAMARIA SE DESARROLLA A PARTIR DEL ECTODERMO?

VERDADERO FALSO

15. EL RECIEN NACIDO PUEDE PRODUCIR CALLOSTRO?

VERDADERO FALSO

16. LAS FASES DE TENER SE REFIEREN A CAMBIOS RELACIONADOS A LA MENARQUIA

VERDADERO FALSO

17. EL DIAMETRO MAYOR NORMAL DE LA PIEL O QUE CUBRE LA GLANDULA MAMARIA ES DE 5 MM.?

VERDADERO FALSO

18. LA AREOLA CONTIENE: GLANDULAS SUDORIFICAS, GRASA Y FOLICULOS PILOSOS?

VERDADERO FALSO

19. LA PIEL Y EL PEZON SE OBSERVAN CON AUMENTO EN LA CAPTACION DEL CONTRASTE DE RM NORMALMENTE?

VERDADERO FALSO

20. LA MAYORIA DE LOS CARCINOMAS COMIENZAN A PARTIR DE LOS DUCTOS ESTRALOBULILLARES TERMINALES?

VERDADERO FALSO

21. LOS CARCINOMAS EN SENO SE PUEDEN PRESENTAR EN LOS DUCTOS SEGMENTARIOS Y PRINCIPALES?

VERDADERO FALSO

Nombre:
Universidad y Nivel:
Fecha:

22. Característica principal de la Ginecomastia?

- a. Localiza en CSE
- b. Ubicación central y retroareolar
- c. Lesión del pezón
- d. Ganglios retromamarios

23. ¿Cuál de las siguientes NO se considera causa de error en el momento de interpretar la resonancia magnética?

- a. Movimientos del paciente
- b. Presencia de líquido periprotésico
- c. Falla en la saturación de agua
- d. Falla en la saturación de silicona

24. Los márgenes de las masas por ecografía según BI RADS se denominan así excepto:

- a. Irregulares
- b. Espiculados
- c. Microlobulados
- d. Indefinidos

25. Acerca de las asimetrías globales es cierto que:

- a. ocupan al menos tres cuadrantes.
- b. Se encuentra en al menos el 10% de las mamografías.
- c. La mayoría son secundarias a influencia hormonal o son una variante normal
- d. Se evalúan mejor mediante ecografía

26. Cuáles son los patrones mamográficos de la Ginecomastia?

- a. Ectásico, papilar y glandular difuso
- b. Ductal, filiforme y dendrítico
- c. Endoluminal, exofítico y Nodular
- d. Nodular, Dendrítico y Glandular Difuso

Nombre:
Universidad y Nivel:
Fecha:

27. LOS PAPILOMAS SE ORIGINAN EN LOS ACINOS O ALVEOLOS?

VERDADERO FALSO

28. CADA MUJER PUEDE TENER ENTRE 15 Y 20 LOBULOS EN LOS DOS SENOS?

VERDADERO FALSO

29. LA DISPOSICION DE LOS DUCTOS TERMINALES EN LA AREOLA CORRESPONDEN CON LOS CUADRANTES RESPECTIVOS?

VERDADERO FALSO

30. LOS SENUS LACTIFERUS TIENEN UN DIAMETRO ENTRE 4 Y 5 MM.?

VERDADERO FALSO

31. LAS UNIDADES DUCTALES Y LOBULARES TERMINALES, SE VISUALIZAN OCASIONALMENTE EN ECOGRAFIA?

VERDADERO FALSO

32. LAS UNIDADES DUCTALES Y LOBULARES TERMINALES, SE VISUALIZAN OCASIONALMENTE EN MAMOGRAFIA?

VERDADERO FALSO

33. LOS DUCTOS NORMALES SE PUEDEN OBSERVAR EN RESONANCIA MAGNETICA?

VERDADERO FALSO

34. LOS DUCTOS NORMALES SE PUEDEN OBSERVAR EN RESONANCIA MAGNETICA?

VERDADERO FALSO

Nombre:
Universidad y Nivel:
Fecha:

35.Cuál de estas lesiones no es una patología benigna de la mama masculina?

- a. Dermatofibrosarcoma
- b. Lipoma
- c. Papiloma intraductal
- d. Abscesos subareolares

36. ¿Cuál de los siguientes NO es signo de ruptura intracapsular?

- a. Signo de la escalera
- b. Signo de Linguini
- c. Signo de carrilera
- d. Signo de tormenta de nieve

37.Cuál de los siguientes NO es un hallazgo de certeza de ruptura de implantes en la resonancia magnética?

- a. Signo de la cerradura
- b. Línea subcapsular
- c. Signo de Linguini
- d. Migración de silicona

38. Los siguientes son signos duros sospechosos de malignidad por ecografía excepto:

- a. Márgenes espiculados
- b. Sombra acústica posterior
- c. Extensión ductal
- d. Halo ecogénico grueso

39. ENUMERE SEIS CAMBIOS FISIOLÓGICOS QUE SE PRODUCEN EN LA GLÁNDULA MAMARIA, NORMALMENTE

VERDADERO FALSO

40. LOS PAPILOMAS SE ORIGINAN EN LOS ACINOS O ALVEÓLOS?

VERDADERO FALSO

Nombre:
Universidad y Nivel:
Fecha:

41. UNA MAMOGRAFÍA ANORMAL INCLUYE CATEGORÍA 0 – 4 – 5 DE LA CLASIFICACIÓN DE BIRADS?.

VERDADERO FALSO

42. ENTRE EL 11% Y EL 16% DE LAS MASAS PALPABLES SON VISIBLES EN LA MAMOGRAFÍA?

VERDADERO FALSO

43. LA CLASIFICACIÓN DEL CÁNCER DE SENO, INCLUYE HALLAZGOS CLÍNICOS Y PATOLÓGICOS, BASADOS EN EL SISTEMA TNM?

VERDADERO FALSO

44. T, SIGNIFICA TAMAÑO TUMORAL?

VERDADERO FALSO

45. ENTRE EL 25 Y EL 40% DE LAS BIOPSIAS RECOMENDADAS, NO SON POSITIVAS PARA CÁNCER?

VERDADERO FALSO

46. LA COLA DE SPENCER ES UNA EXTENSION DE TEJIDO GLANDULAR, DENTRO DE LA AXILA

VERDADERO FALSO

47. LOS ELEMENTOS GLANDULARES CONTIENEN DUCTOS EXTRALOBULARES, UNIDADES DUCTALES Y LOBULARES TERMINALES?

VERDADERO FALSO

48. LOS DUCTOS EXTRALOBULARES Y LAS UNIDADES DUCTALES Y LOBULARES TERMINALES, CONTIENEN DOS CLASES DE CELULAS?

VERDADERO FALSO

Nombre:

Universidad y Nivel:

Fecha:

D

M

A

49. Un ganglio intramamario esta clasificado como BIRADS:

- a. 0
- b. 1
- c. 2
- d. 3
- e. 4

50. De la elastografía, es cierto:

- a. Permite estimar propiedades viscoelásticas del tejido
- b. La información es como la obtenida con la palpación manual
- c. Analiza la tensión o deformación de las lesiones
- d. Se representa la elasticidad en mapade color o en blanco y negro
- e. Todas las anteriores